



**Patient Information Leaflet (PIL)
Vilda Tablets
(Vildagliptin)**

Read all of this leaflet carefully before you start taking this medicine. The dispensing of this medicine requires a doctor's prescription

- Keep this leaflet. You may need to read it again
- If you have any further questions, ask your doctor or pharmacist
- This medicine has been prescribed for you. Do not pass it on to others. It may harm them, even if their symptoms are the same as yours
- If any of the side effects gets serious, or if you notice any side effects not listed in this leaflet, please tell your doctor or pharmacist.

In this leaflet:

1. What Vilda is and what it is used for
2. What you need to know before you take Vilda
3. How to take Vilda
4. Possible side effects
5. How to store Vilda
6. Contents of the pack and other further information.

1. What Vilda is and what it is used for

Vilda is an oral antidiabetic agent of the Dipeptidyl peptidase 4 (DPP-4) enzyme inhibitors group

Vilda is intended as a supplement to diet and exercise in patients with uncontrolled type 2 diabetes taken either alone or in combination with certain other anti-diabetes medicines, in the following cases:

- As an adjunct therapy
- As an addition to a medicine containing metformin or sulphonylurea
- As a third addition for patients taking a combination of metformin and a sulphonylurea
- As an addition to a medicine containing a thiazolidinedione
- As an addition for patients being treated with insulin, with or without metformin.

2. Before you take Vilda

Do not take Vilda:

- If you have known hypersensitivity to Vildagliptin or any of the other ingredients of this medicine
- If you are pregnant or breastfeeding
- If you have previously taken Vilda but had to stop taking it because of liver disease.

Take special care with Vilda. Tell your doctor or pharmacists before you take Vilda:

- If you have type 1 diabetes (i.e. your body does not produce insulin) or if you have a condition called diabetic ketoacidosis
- If you are taking an anti-diabetic medicine known as a sulphonylurea (your doctor may want to reduce your dose of the sulphonylurea when you take it together with Vilda in order to avoid low blood glucose [hypoglycaemia])



- If you have moderate or severe kidney disease (you will need to take a lower dose of Vilda)
- If you are undergoing dialysis
- If you have liver disease
- If you suffer from heart failure
- If you have or have had a disease of the pancreas
- If you have muscle pain

Diabetic skin lesions are a common complication of diabetes. You are advised to follow the recommendations for skin and foot care that you are given by your doctor or nurse. You are also advised to pay particular attention to new onset of blisters or ulcers while taking Vilda. Should these occur, you should promptly consult your doctor.

Taking other medicines, herbal or dietary supplements:

If you are taking another medicine concomitantly or if you have just finished treatment with another medicine inform your physician in order to prevent hazards or lack of efficacy resulting from drug interactions including medicines obtained without a prescription. This is especially important for the following drugs: Thiazides or other diuretics, corticosteroids, thyroid medicines, certain medicines affecting the nervous system.

Pregnancy and breast-feeding:

- If you are pregnant or breast-feeding, think you may be pregnant or are planning to have a baby, ask your doctor or pharmacist for advice before taking this medicine
- You should not use Vilda during pregnancy. It is not known if Vilda passes into breast milk. You should not use Vilda if you are breast-feeding or plan to breast-feed.

Children & adolescents:

The use of Vilda in children and adolescents up to 18 years of age is not recommended.

Driving and using machines:

If you feel dizzy while taking Vilda, do not drive or use machines.

Important information about some of the ingredients of Vilda that may have undesirable effects on some patients:

Vilda contains:

- **Lactose anhydrous:** If you have been told by your doctor that you have intolerance to some sugars, contact your doctor before taking this medicinal product
- **Sodium:** This medicine contains less than 1mmol sodium per tablet, and is therefore considered to be 'sodium free'.

Diagnostic tests:

You will undergo a liver function test before treatment with Vilda. During the first year of treatment, you will undergo a liver function test every 3 months, and periodically thereafter. This is to allow for the earliest detection as possible of signs of increased liver enzymes.

3. How to take Vilda

Always take Vilda exactly as your doctor has told you. You should check with your doctor or pharmacist if you are not sure.



Dosage and instructions for proper use:

- The dose is according to the physician's instructions
- Depending on your response to the treatment, the doctor may increase or lower the dosage of the medicine
- The usual dose of Vilda is generally either 50 or 100 mg per day:
 - If you are taking Vilda alone, the usual dosage is 50 mg per day, taken as one dose in the morning, or 100 mg per day, taken as 50 mg dose in the morning and 50 mg in the evening
 - If you are taking Vilda in combination with another medicine containing a sulfonylurea, the usual dosage is 50 mg per day, taken as one dose in the morning
 - If you are taking Vilda in combination with another medicine containing metformin or glitazone, in combination with metformin and a sulfonylurea, or with insulin (with/without metformin), the usual dosage is 100 mg per day, taken as a 50 mg dose in the morning and 50 mg in the evening
- Do not exceed the recommended dosage
- Swallow the tablets whole with a glass of water. Do not chew
- Vilda can be taken with or without food
- If your doctor told you to take this medicine once a day- take it in the morning
- Take Vilda every day for as long as your doctor tells you. You may have to take this treatment over a long period of time
- Your doctor will regularly monitor your condition to check that the treatment is having the desired effect.

If you take more Vilda than you should:

If you took an overdose, or if a child has accidentally swallowed the medicine, refer immediately to a doctor or to a hospital emergency room, and bring the package of the medicine with you.

If you forget to take Vilda:

If you forget to take a dose of this medicine, take it as soon as you remember. Then take your next dose at the usual time. If it is almost time for your next dose, skip the dose you missed. Do not take a double dose to make up for a forgotten tablet.

If you stop taking Vilda:

Do not stop taking Vilda unless your doctor tells you to. If you have questions about how long to take this medicine, talk to your doctor.

If you have any further questions on the use of this product, ask your doctor or pharmacist.

4. Possible side effects

Like all medicines, Vilda can cause side effects, although not everybody gets them

- **Stop the treatment with the medicine and refer immediately to the physician if you have one or more of the following effects:**

Rare:

- Angioedema: Symptoms include swollen face, tongue or throat, difficulties in swallowing, difficulties in breathing, sudden onset of rash or hives



- Liver disease (hepatitis): Symptoms include yellowing of the skin and eyes, nausea, loss of appetite, dark urine, symptoms indicative of liver diseases (Jaundice)

Frequency not known:

Inflammation of the pancreas (pancreatitis): Symptoms include severe and persistent pain in the abdominal area, which might radiate to your back, as well as nausea and vomiting

• Contact your doctor immediately if you experience:

Muscle pain, muscle sensitivity or muscle weakness. This because in rare cases, muscle problems may be serious, including muscle breakdown (rhabdomyolysis), which may lead to kidney damage and then death. This risk of muscle breakdown (rhabdomyolysis) may be higher in elderly patients (65 years of age and above), female patients, patients with kidney function problems, patients with thyroid problems and patients taking higher doses of Vilda

• Other side effects:

- Some patients have had the following side effects while taking Vilda and metformin:

Common: Trembling, headache, dizziness, nausea, low blood glucose level

Uncommon: Tiredness

- Some patients have had the following side effects while taking Vilda and a sulphonylurea:

Common: Trembling, headache, dizziness, weakness, low blood glucose level

Uncommon: Constipation

Very rare: Sore throat, runny nose

- Some patients have had the following side effects while taking Vilda and a glitazone:

Common: Weight increase, swollen hands, ankle or feet (oedema)

Uncommon: Headache, weakness, low blood glucose level

- Some patients have had the following side effects while taking Vilda alone:

Common: Dizziness

Uncommon: Headache, constipation, swollen hands, ankle or feet (oedema), joint pain, low blood glucose level

Very rare: Sore throat, runny nose, fever

- Some patients have had the following side effects while taking Vilda, metformin and a sulphonylurea:

Common: Dizziness, tremor, weakness, low blood glucose level, excessive sweating

- Some patients have had the following side effects while taking Vilda and insulin (with or without metformin):

Common: Headache, chills, nausea, low blood glucose level, heartburn

Uncommon: Diarrhoea, flatulence

Reporting of side effects

- If any of the side effects gets serious, or if you notice any side effects not listed in this leaflet, please tell your doctor or pharmacist.



- To report any side effect(s) to ministry of health directly fill the on-line reporting form at the following link: <https://www.pharmacy.moh.ps/index/Form/Language/ar> and to the marketing authorization holder website: <http://www.beitjalapharma.com/index.php/en-gb/reports/>.

5. How to store Vilda

- Keep out of the reach and sight of children
- Store this medicine in its original package at temperature below 30 °C, away from moisture
- Do not use Vilda after the expiry date which is stated on the carton. The expiry date refers to the last day of that month
- Medicines should not be disposed of via wastewater or household waste. Ask your pharmacist how to dispose of medicines no longer required. These measures will help to protect the environment.

6. Contents of the pack & other further information

What Vilda contains:

Each tablet contain 50 mg Vildagliptin

What Vilda looks like and contents of the pack:

Vilda tablets are a white to off-white round biconvex tablets. It is available in a box of 28 tablets.

Marketing Authorisation Holder

Product Licence held by Beit Jala Pharmaceutical Company
81, Al-Madaress Str., P.O.Box 58, Beit Jala –Palestine
<http://www.beitjalapharma.com>

Manufacturing company



Beit Jala Pharmaceutical Co.

81, Al-Madaress Str.

P.O.Box 58

Beit Jala –Palestine

<http://www.beitjalapharma.com>

This leaflet was last revised in May 2022, version number 1401410-0.



نشرة معلومات المريض فيلدا أقراص (فيلداچليبنتين)

اقرأ النشرة كاملة بتمعن قبل تناول هذا الدواء. هذا الدواء ملزم بوصفة طبيب.

- احتفظ بهذه النشرة. قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى
- إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، اسأل طبيبك أو الصيدلي
- تم وصف هذا الدواء لك فقط. لا تعطه للآخرين. فقد يضرهم، حتى لو كانت أعراضهم مشابهة لأعراضك
- أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا تفاقم أي أثر من الآثار الجانبية أو إذا لاحظت أي آثار جانبية غير مدرجة في هذه النشرة.

في هذه النشرة:

1. ما هو فيلدا وما هي دواعي استعماله
2. قبل القيام بتناول فيلدا
3. كيفية استعمال فيلدا
4. الآثار الجانبية المحتملة
5. كيفية تخزين فيلدا
6. محتويات التعبئة وغيرها من المعلومات الأخرى.

1. ما هو فيلدا وما هي دواعي استعماله

يعتبر فيلدا من مضادات السكري الفموية من مجموعة مثبطات الإنزيم ديببتيديل بيتيداز - 4 (DPP-4)

يستخدم فيلدا كإضافة للنظام الغذائي وممارسة الرياضة لدى المرضى الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2 غير المنضبط ، ويتم تناوله إما بمفرده أو مع بعض الأدوية الأخرى المضادة للسكري ، في الحالات التالية:

- كعلاج إضافي
- كإضافة لدواء يحتوي على ميتفورمين أو سلفونيل يوريا
- كإضافة لثلاثة للمرضى الذين يتناولون مزيجاً من الميتفورمين والسلفونيل يوريا
- كإضافة لدواء يحتوي على ثيازوليدينيون
- كإضافة للمرضى الذين يتعالجون بالإنسولين، مع أو بدون ميتفورمين.

2. قبل القيام بتناول فيلدا

لا تتناول فيلدا:

- إذا كنت تعاني من حساسية معروفة لفيلداچلبنتين أو أي من المكونات الأخرى لهذا الدواء
- إذا كنت حاملاً أو مرضعة
- إذا قمت في الماضي بتناول فيلدا ولكن اضطررت للتوقف عن تناوله بسبب مرض الكبد.

استعمل فيلدا بعناية خاصة. أعلم الطبيب أو الصيدلي قبل تناول هذا الدواء:

- إذا كنت تعاني من مرض السكري نوع 1 (أي أن جسمك لا ينتج الإنسولين) أو إذا كنت تعاني من حالة اسمها الخُمَاض الكيتوني السكري
- إذا كنت تتناول دواءً مضاداً للسكري معروف بـ سلفونيل يوريا (قد يرغب طبيبك بتقليل جرعتك من السلفونيل يوريا عندما تقوم بتناوله مع فيلدا لتجنب انخفاض السكر في الدم
- إذا كنت تعاني من مرض كلّي معتدل أو مزمن (سوف تحتاج إلى تناول جرعة أقل من فيلدا)
- إذا كنت تقوم بغسيل الكلى (الديليزة)
- إذا كنت تعاني من مرض كبد
- إذا كنت تعاني من فشل في القلب



- إذا كنت تعاني أو عانيت في الماضي من مرض في البنكرياس
- إذا كنت تعاني من ألم عضلي

تعتبر آفات الجلد السكري من المضاعفات الشائعة لمرض السكري. ننصحك باتباع توصيات العناية بالجلد و القدم التي قدمها لك طبيبك أو الممرضة. ننصحك أيضاً بأن تولي اهتماماً خاصاً لبداية ظهور بثور أو تقرحات اثناء تناولك لقيلدا. في حال حدوث ذلك، يجب استشارة طبيبك فوراً.

تداخلات الدواء مع أدوية أخرى، أعشاب أو مكملات غذائية:

إذا كنت تتناول دواءً آخرًا في نفس الوقت أو إذا انتهيت مؤخرًا من العلاج بدواء آخر أعلم طبيبك بذلك لتجنب المخاطر أو قلة نجاعة العلاج التي تنتج من التفاعلات بين الأدوية بما في ذلك الأدوية المصروفة بدون وصفة طبية. هذا مهم خاصة للأدوية التالية: ثيازيد أو مدرات البول الأخرى، كورتيكوستيرويدات أدوية الغدة الدرقية، أدوية معينة تؤثر على الجهاز العصبي.

الحمل والرضاعة الطبيعية:

- استشير طبيبك أو الصيدلي قبل تناول هذا الدواء إذا كنت حاملاً ، أو مرضعاً ، تعتقدين بأنك حامل أو إذا كنت تخططين للحمل
- لا يجب عليك استخدام قيلدا أثناء الحمل. من غير المعروف إذا كان قيلدا قد يفرز داخل حليب الثدي. لا يجب عليك استخدام قيلدا إذا كنت ترضعين طفلك أو تخططين لإرضاعه رضاعة طبيعية.

الأطفال و البالغين:

لا ينصح باستخدام قيلدا من قبل الأطفال و البالغين حتى عمر ١٨ عاماً.

القيادة واستخدام الآلات:

لا تقم بالقيادة أو استخدام الماكينات إذا شعرت بالدوخة أثناء تناول قيلدا.

معلومات هامة تتعلق ببعض المواد غير الفعالة للقيلدا والتي لها آثار غير مرغوبة على صحة بعض المرضى:
يحتوي قيلدا على:

- لاكتوز لا مائي: تواصل مع طبيبك قبل تناول هذا الدواء إذا أخبرك بوجود عدم تحمل لبعض السكريات لديك.
- صوديوم: يحتوي هذا الدواء على أقل من ١ ميليومول صوديوم في القرص، لذلك يعتبر 'خالٍ من الصوديوم'.

الفحوصات التشخيصية

ستحتاج فحص وظائف الكبد قبل العلاج بقيلدا. خلال سنة العلاج الأولى، ستحتاج فحص وظائف الكبد كل ٣ أشهر و بشكل دوري لاحقاً لإتاحة الكشف المبكر قدر الإمكان لعلامات زيادة إنزيمات الكبد.

٣. كيفية استعمال الدواء

احرص دائماً على تناول قيلدا تماماً كما أخبرك طبيبك. يجب عليك استشارة طبيبك أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا.

الجرعة و تعليمات الاستخدام الأمثل:

• الجرعة حسب إرشادات الطبيب

• بإمكان الطبيب رفع أو خفض المقدار الدوائي من الدواء وذلك وفقاً لإستجابتك للعلاج

• الجرعة الإعتيادية لقيلدا هي عادةً إما ٥٠ أو ١٠٠ ملغم يومياً:

- الجرعة الإعتيادية لقيلدا إذا كنت تتناوله لوحده هي ٥٠ ملغم يومياً تؤخذ كجرعة واحدة في الصباح، أو ١٠٠ ملغم يومياً تؤخذ كجرعة ٥٠ ملغم في الصباح و ٥٠ ملغم في المساء

- الجرعة الإعتيادية لقيلدا إذا كنت تتناوله مع دواء آخر يحتوي على سلفونيلوريا هي ٥٠ ملغم يومياً ، تؤخذ كجرعة واحدة في الصباح

- الجرعة الإعتيادية لقيلدا إذا كنت تتناوله مع دواء آخر يحتوي على الميتفورمين او الغليتازون، أو بالإشتراك مع الميتفورمين و السلفونيلوريا، أو مع الإنسولين (مع/بدون ميتفورمين) هي ١٠٠ ملغم يومياً، تؤخذ كجرعة ٥٠ ملغم في الصباح و ٥٠ ملغم في المساء

• لا تقم بتجاوز الجرعة الموصى بها



• ابتلع الأقراص كاملة مع كأس من الماء. لا تقم بمضغها

• يمكنك تناول فيلدا مع أو بدون طعام

• إذا أخبرك طبيبك أن تتناول هذا الدواء مرة واحدة يومياً- تناوله في الصباح

• تناول فيلدا يومياً طالما أخبرك الطبيب بذلك. قد تضطر لتناول هذا العلاج لفترة طويلة من الزمن

• سوف يقوم طبيبك بمراقبة حالتك بانتظام للتأكد من أن العلاج يعطي التأثير المطلوب.

إذا تناولت فيلدا أكثر من اللازم:

إذا تناولت جرعة زائدة، أو إذا ابتلع طفل الدواء عن طريق الخطأ، توجه حالاً إلى طبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى، وأحضر معك علبة الدواء.

إذا نسيت تناول فيلدا:

تناول الجرعة المنسية حالما تتذكر ثم قم بتناول الجرعة التالية في وقتها المعتاد. تجاوز الجرعة التي فاتتك إذا حان موعد الجرعة التالية. لا تتناول جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة المنسية.

إذا توقفت عن تناول فيلدا:

لا تتوقف عن تناول فيلدا إلا إذا أخبرك طبيبك بذلك. تحدث إلى طبيبك إذا كان لديك أسئلة عن المدة الزمنية لتناول هذا الدواء.

إذا كان لديك أي أسئلة أخرى حول استعمال هذا الدواء، اسأل الطبيب أو الصيدلي.

٤. الآثار الجانبية المحتملة

مثل جميع الأدوية ، قد يسبب فيلدا آثاراً جانبية، ولكن لا يشترط حدوثها مع الجميع

• **توقف عن العلاج واتصل بطبيبك فوراً إذا عانيت من واحدة أو أكثر من الأعراض التالية:**

نادرة:

- وذمة وعائية:تشمل الأعراض تورم الوجه،اللسان أو الحلق،صعوبة في البلع،التنفس، ظهور مفاجئ لطفح أو شرى

- مرض في الكبد (التهاب الكبد):تشمل الأعراض اصفرار الجلد و العينين، غثيان،فقدان الشهية،بول داكن اللون أعراض التي تدل على أمراض في الكبد (يرقان)

تكرار غير معروف:

التهاب البنكرياس:تشمل الأعراض ألم شديد و مستمر في منطقة البطن و الذي قد يتردد إلى الظهر ،بالإضافة إلى الغثيان و التقيؤ

• **اتصل بطبيبك على الفور إذا واجهت:**

آلام العضلات ، حساسية العضلات أو ضعف العضلات. هذا لأنه في حالات نادرة ، قد تكون مشاكل العضلات خطيرة ، بما في ذلك الإنحلال العضلي (انحلال الرُّبَيْدَات) ، مما قد يؤدي إلى تلف الكلى ثم الوفاة. قد يكون خطر الإنحلال العضلي (انحلال الرُّبَيْدَات) أعلى عند المرضى كبار السن (٦٥ سنة وما فوق) ، المرضى الإناث ، المرضى الذين يعانون من مشاكل في وظائف الكلى ، المرضى الذين يعانون من مشاكل الغدة الدرقية والمرضى الذين يتناولون جرعات أعلى من فيلدا

• **أعراض جانبية أخرى:**

- وُجِدَت الأعراض الجانبية التالية عند بعض المرضى الذين يتناولون فيلدا مع ميتفورمين:

شائعة:ر عشة،صداع،دوخة،غثيان ،انخفاض السكر في الدم

غير شائعة: تعب

- وُجِدَت الأعراض الجانبية التالية عند بعض المرضى الذين يتناولون فيلدا مع سلفونيربيوريا:

شائعة: ر عشة،صداع،دوخة،هزال،انخفاض مستوى السكر في الدم



غير شائعة: إمساك
نادرة جداً: التهاب الحلق، سيلان الأنف

- وُجدت الأعراض الجانبية التالية عند بعض المرضى الذين يتناولون فيلدا مع غليتازون:
شائعة: زيادة في الوزن، تورم اليدين، وذمة الكاحل أو القدمين
غير شائعة: صداع، هزال، انخفاض مستوى السكر في الدم

- وُجدت الأعراض الجانبية التالية عند بعض المرضى الذين يتناولون فيلدا لوحده:
شائعة: دوخة

غير شائعة: صداع، إمساك، تورم اليدين، وذمة الكاحل أو القدمين، ألم في المفاصل، انخفاض مستوى السكر في الدم
نادرة جداً: التهاب الحلق، سيلان الأنف، حمى

- وُجدت الأعراض الجانبية التالية عند بعض المرضى الذين يتناولون فيلدا، ميتفورمين و سلفونيلورييا:
شائعة: دوخة، رُعاش، هزال، انخفاض مستوى السكر في الدم، تعرق مفرط

- وُجدت الأعراض الجانبية التالية عند بعض المرضى الذين يتناولون فيلدا مع الإنسولين (مع أو بدون ميتفورمين):
شائعة: صداع، قشعريرة، غثيان، (الشعور بالمرض)، انخفاض مستوى السكر في الدم، حرقة المعدة
غير شائعة: إسهال، نفخة

الإبلاغ عن الآثار الجانبية

- إذا أصبحت أي من الآثار الجانبية خطيرة، أو إذا لاحظت أي آثار جانبية غير مدرجة في هذه النشرة، يرجى إخبار طبيبك أو الصيدلي
- للإبلاغ مباشرة عن أي أثر/ آثار جانبية لوزارة الصحة، قم بتعبئة نموذج الإبلاغ الإلكتروني على الرابط التالي: <https://www.pharmacy.moh.ps/index/Form/Language/ar> وعلى الموقع الإلكتروني للشركة <http://www.beitjalapharma.com/index.php/en-gb/reports/>.

٥. كيفية تخزين فيلدا

- احفظ الدواء بعيداً عن متناول و مرأى الأطفال.
- احفظ الدواء في عبوته الأصلية على درجة حرارة أقل من ٣٠°م، بعيداً عن الرطوبة
- لا تستعمل فيلدا بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المذكور على العلبة الخارجية. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من ذلك الشهر
- لا تتخلص من أي أدوية عن طريق مياه الصرف الصحي أو النفايات المنزلية. اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد تستخدمها. هذه المعايير سوف تساعد على حماية البيئة.

٦. محتوى العبوة ومعلومات إضافية

على ماذا يحتوي فيلدا:
يحتوي كل قرص على ٥٠ ملغم فيلداجلبتين



شركة بيت جالا لصناعة الادوية
Beit Jala Pharmaceutical Co.
بيت جالا - فلسطين
Beit Jala - Palestine

Vilda Tablets Leaflet Art Work

Doc. No. : PAW-25-7679-0

Issue date: 28/4/2022

Page 10 of 10

كيف يبدو الدواء ومحتوى التعبئة:
فيلدا أقراص هو عبارة عن أقراص بيضاء إلى بيضاء ضاربة للصفرة دائرية الشكل محدبة. يتوفر هذا الدواء في علبة تحتوي على ٢٨ قرص.

اسم الشركة المالكة لحق التسويق :
ترخيص المنتج لدى شركة بيت جالا للادوية
٨١ ، شارع المدارس ، ص.ب ٥٨ ، بيت جالا- فلسطين
<http://www.beitjalapharma.com>

اسم الشركة المصنعة :



شركة بيت جالا لصناعة الأدوية

٨١ ، شارع المدارس

ص.ب ٥٨

بيت جالا- فلسطين

<http://www.beitjalapharma.com>

تم مراجعة هذه النشرة في أيار 2022، رقم الإصدار 0-1401410.