

NEUROVIT

TABLETS

Prescription Only Medicine

Composition:

Each sugar coated tablet contains:

Vitamin B ₁₂	250 mcg
Vitamin B ₁	100 mg
Vitamin B ₆	250 mg

Therapeutic Activity:

Vitamins from B-complex group.

Indications:

Neuropathies: polyneuritis, neurological syndromes, neuralgia, trigeminal neuralgia, lumbago, myalgia, migraine, Herpes Zoster.

Metabolic disorders: Asthenia, growth and tone disorders, severe anemias, cerebral metabolic disorders, fatigue syndrome, dysmetabolic conditions.

Anemia caused by vitamin B₁₂ and / or vitamin B₆ deficiency and alcoholism.

When should not the product be used:

- Neurovit is contraindicated in patients with known hypersensitivity to any of the components.
- Neurovit should not be used in patients on levodopa therapy.

Warnings:

An inadequate therapeutic response may be due to infection, uremia, bone marrow suppressant drugs such as chloramphenicol, concurrent iron therapy, or folic acid deficiency.

Do not take this medicine without consulting your physician before starting treatment:

Safety of use during pregnancy, breast-feeding and in children has not been established. Therefore this drug should only be used when clearly needed.

Precautions:

- Administration of vitamin B₁₂ may mask the true diagnosis of pernicious anemia.
- Serum potassium must be watched closely and potassium supplement administered if necessary, since hypokalemia may result from intensive treatment of megaloblastic anemia.

Drug Interactions:

If you are taking another drug concomitantly or if you have just finished treatment with another medicine, inform your physician. This is especially important when using the following drugs:

Levodopa, cycloserine, isoniazid, chloramphenicol, ethionamide, hydralazine, penicillamine, immunosuppressants, estrogens, phenobarbital, phenytoin, cimetidine, colchicine, slow-release potassium and excessive alcohol intake.

Side Effects:

In addition to the desired effect of the medicine, adverse reactions may occur during the course of taking this medicine for example: itching, transitory exanthema, acne form and bullous eruptions may occur rarely.

Recommended dosage unless otherwise directed by your physician:

Adults and children over 12 years: 1 tablet daily

Missed Dose:

Take the missed dose as soon as you remember, however if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and take only your next regularly scheduled dose.

To Avoid Poisoning:

1. Keep the medicine out of the reach of children.
2. If an excessive dose is taken or if a child swallowed the medication accidentally, seek help at an emergency and take the remaining medicine with you.
3. Do not induce vomiting without consulting your physician.
4. Do not take your medication in the dark, always read the label and make sure you are using the right medication.
5. Always notice the expiry date and never take medicines after the mentioned date.
6. Avoid exposure of the drug to excessive heat and humidity during storage.
7. Take the drug only as prescribed and do not exceed the recommended dose.

Storage:

Store at a temperature between 15-30 °C, away from moisture.

Presentation:

A box of 20 sugar coated tablets.



Beit Jala Pharmaceutical Co.

81, Al-Madaress St.

P. O. Box 58

Beit Jala – Palestine

<http://www.beitjalapharma.com>

نيوروفيت أقراص

ملزم بوصفة طبية

التركيبية الدوائية:

يحتوي كل قرص ملبس على:

فيتامين ب12	250 ميكروغرام
فيتامين ب1	100 ميلليغرام
فيتامين ب6	250 ميلليغرام

الفاعلية العلاجية:

فيتامينات من مجموعة ب

الاستعمالات:

الاضطرابات العصبية : التهاب الأعصاب المتعددة، متلازمة الاعصاب، الألم العصبي، ألم عصب التريجينيموس، ألم القطن، ألم عضلي، الشقيقة، و ال (Herpes Zoster) الاضطرابات الأيضية: الوهن، اضطرابات النمو والتوتر، فقر الدم المزمن، اضطرابات الاستقلاب الدماغي، متلازمة التعب، حالات خلل الأيض. فقر الدم الناتج عن نقص فيتامين ب 12 و/ أو فيتامين ب6، وفي حالة الإدمان على الكحول.

متى يمنع استخدام هذا الدواء:

- يمنع استخدام أقراص نيوروفيت للمرضى الذين لديهم حساسية لإحدى مركباته.
- يمنع استخدام أقراص نيوروفيت للمرضى الذين يستخدمون ليفودوبا.

تحذيرات:

قد يحدث خلل في الإستجابة الكاملة للعلاج وذلك نتيجة وجود التهابات أو ظهور دم في البول أو استخدام كابتات مخ العظام مثل كلورامفينيكول أو العلاج المتزامن بالحديد أو نقص حامض الفوليك.

لا تستخدم هذا الدواء دون استشارة الطبيب قبل بدء العلاج:

لا توجد دراسات تؤكد سلامة استعمال هذا الدواء خلال فترة الحمل والرضاعة ومن قبل الأطفال، لذلك لا يجوز استعمال هذا الدواء إلا في حالة الضرورة.

احتياطات:

- قد يؤدي استخدام فيتامين ب12 الى صعوبة الكشف عن مرض Pernicious Anemia في حال وجوده لدى المرضى.

- يجب اجراء فحص بشكل مستمر لتركيز البوتاسيوم في الدم وتناول مركبات البوتاسيوم عند الضرورة لأن نقص البوتاسيوم قد يحدث نتيجة العلاج المكثف لميجالوبلاستيك أنيميا.

تفاعلات الدواء:

إذا كنت تستخدم دواء آخر في نفس الوقت أو انتهيت مؤخراً من تناول دواء آخر، يجب إعلام الطبيب خاصة عند استخدام الأدوية التالية:
ليفودوبا، سيكلوسيرين، أيزونيازيد، كلورامفينكول، اثيوناميد، هايدرالزين، بنيسيلامين، كابيتات المناعة، ايستروجينات، فينوباريتال، فينيتوين، سيميتدين، كولشسين، مركبات البوتاسيوم، التناول المفرط للكحول.

الأعراض الجانبية:

إضافة إلى التأثيرات المرغوبة للدواء قد تظهر تأثيرات غير مرغوب بها أثناء تناول الدواء مثل حكة، طفح مؤقت، Acne form ونادراً قد يحدث طفح فقاعي.

الجرعة الدوائية الموصى بها مالم توجد تعليمات أخرى من الطبيب:

الكبار والأطفال الذين تزيد أعمارهم عن **12** سنة: قرص واحد يومياً

في حال نسيان الجرعة:

تناول الجرعة المناسبة فور تذكرك ذلك، إلا إذا كان موعد الجرعة التالية، اترك الجرعة المناسبة و تناول فقط جرعتك الاعتيادية التالية حسب جدول الجرعات.

لتجنب التسمم:


1. احفظ الدواء بعيداً عن متناول الأطفال.
2. إذا تناولت جرعة زائدة أو إذا ابتلع طفل الدواء عن طريق الخطأ ، فيجب عليك مراجعة قسم الطوارئ و معك بقايا الدواء.
3. لا تحاول إحداث التقيؤ دون استشارة الطبيب.
4. لا تستعمل الدواء في الظلام و تأكد من اسم الدواء الموصوف لك.
5. تأكد دائماً من تاريخ نهاية صلاحية الدواء و لا تستعمل الدواء بعد تاريخ الإنتهاء المذكور.
6. تجنب تعريض الدواء للحرارة و الرطوبة الشديتين خلال فترة التخزين.
7. استعمل الدواء حسب الوصفة فقط ولا تتجاوز الجرعة الموصى بها.

التخزين:

احفظ الدواء على درجة حرارة ما بين **15-30** °م، بعيداً عن الرطوبة.

العبوة:

علبة تحتوي على 20 قرص ملبس.



شارع المدارس رقم 81

ص . ب 58

بيت جالا - فلسطين

<http://www.beitjalapharma.com>