

PARAFLU

Tablets & Syrup

Composition:

Each coated tablet contains:

| | |
|--------------------------|--------|
| Chlorpheniramine Maleate | 2.5 mg |
| Phenylephrine HCl | 10 mg |
| Paracetamol | 300 mg |
| Ascorbic acid | 100 mg |
| Caffeine | 30 mg |

Each teaspoonful (5 ml) syrup contains:

| | |
|--------------------------|------|
| Chlorpheniramine Maleate | 1 mg |
| Phenylephrine HCl | 2 mg |

Therapeutic Activity:

Decongestant, Antihistamine.

Indications:

Paraflu is indicated for the treatment of common colds, influenza, congestion associated with sinusitis, allergic rhinitis and headache.

Contraindications:

- Do not use this medicine if you are sensitive to any of its ingredients
- Newborn, premature infants and lactating mothers
- Glaucoma
- Crisis of asthma
- Obstruction of the urethra
- Symptomatic hypertrophy of the prostate
- Stricture of the duodenum.
- Children under 2 years old are not allowed to take this medicine.

Side Effects:

In addition to the desired effect of Paraflu, certain side effects may occur during the course of taking this medicine, for example:

Dryness of mouth, drowsiness, dizziness, nervousness, restlessness, nausea, abdominal pain and diarrhea.

Side effects of Paraflu tablets that require special attention, treatment should be discontinued if any of these side effects appears:

Allergic reactions: swelling of the face, mouth & throat, difficulty breathing, itching or rash if you take more than recommended & you have diarrhea, vomiting, stomach pain or abdominal cramp.

Precautions:

If you are suffering, or have suffered in the past from asthma, ulcer, glaucoma, hyperthyroidism, impaired function of the heart and vascular system, liver, kidney, urinary tract, prostate gland, diabetes or epilepsy, refer to the physician who shall instruct you to the possibility of using this medicine.

Warnings:

- Paraflu tablets should not be taken with other Paracetamol containing medicines.

- Paraflu tablets contains Paracetamol, severe liver damage may occur if patients:
 - Take more than 8 tablets in 24 hrs.
 - Take with other drugs containing Paracetamol.
 - Consume alcohol drinks during treatment period.

Drug Interactions:

If you are taking another drug concomitantly, or if you have just finished treatment with another medicine, inform your physician, in order to prevent hazards or lack of efficacy arising from drug interactions.

This is especially important in the following:

- Aspirin and salicylates.
- Sedatives and hypnotics
- Drugs for Parkinsonism
- Antiepileptics
- Pain and fever drugs
- Cough and cold preparations
- Antiasthmatic preparations
- NSAIDS
- Antidepressant (MAO inhibitors)
- Aminoglycoside antibiotics.

Pregnancy, Nursing mothers and Pediatrics use:

- Consult the physician if you are pregnant or breast feeding.
- Paraflu is not recommended for newborn babies and premature infants.

Cautions:

- Paraflu may impair alertness; therefore it is not advised to be administered before driving or operating dangerous machinery
- Do not drink a lot of tea or coffee while taking Paraflu.

To Avoid Poisoning:

- Keep the medicine out of the reach of children.
- If an excessive dose is taken or if a child swallowed the medication accidentally, seek help at an emergency and take the remaining medicine with you.
- Do not induce vomiting without consulting your physician.
- Do not take your medication in the dark, always read the label and make sure you are taking the right medication.
- Always notice the expiry date, and never use medicines after the mentioned date.
- Avoid exposure of the drug to excessive heat and humidity during storage
- Take the drug only as needed and do not exceed the prescribed dose.

Dosage:

Tablets:

- Adults and children 12 years of age and older: 2 tablets, 3-4 times daily.
- The maximum recommended dose of Paraflu tablets is 8 tablets daily.

Syrup:

- Children 6-12 years: 1 teaspoonful, 3-4 times daily
- Children 2-6 years: 1/2 teaspoonful, 3-4 times daily.

Directions for Use:

Paraflu is preferably taken with meals.

Storage:

Tablets: Store in a dry place, at a temperature between 15-30°C.

Pediatric syrup: Store at a temperature between 15-30°C.

Presentation:

-A box of 20 coated tablets

-A bottle of 60 ml syrup.



Beit Jala Pharmaceutical Co.

81, Al-Madaress St.

P.O.Box 58

Beit Jala-Palestine

<http://www.beitjalapharma.com>

1401120-4

بارافلو

أقراص وشراب

التركيبية الدوائية:

| | |
|--------------------------|----------|
| كل قرص مغلف يحتوي على: | |
| كلورفينيرامين ماليات | 2.5 ملغم |
| فنيل افرين هايدروكلورايد | 10 ملغم |
| براسيتامول | 300 ملغم |
| اسكوربيك أسيد | 100 ملغم |
| كافيين | 30 ملغم |

| | |
|-------------------------------------------|--------|
| كل ملعقة صغيرة (5 مليلتر) شراب تحتوي على: | |
| كلورفينيرامين ماليات | 1 ملغم |
| فنيل افرين هايدروكلورايد | 2 ملغم |

الفاعلية العلاجية:

مزيج للاحتقان، مضاد للهيستامين.

الاستعمالات:

يستخدم بارافلو لعلاج أعراض الرشوحات والبرد والانفلونزا ، احتقان الجيوب الأنفية ، الرشح التحسسي ، والصداع.

دواعي عدم الاستعمال:

- لا يجوز لك استعمال هذا الدواء إذا وجدت لديك حساسية لإحدى مركباته
- حديثي الولادة، الخدج، المرضعات
- الجلوكوما
- نوبات الربو
- انسداد الاحليل
- تضخم البروستات العرضي
- تضيق في الاثنا عشر.
- يمنع استخدام هذا الدواء للأطفال الذين هم دون سن الثانية.

الأعراض الجانبية:

إضافة إلى الفعالية المرغوبة للدواء، قد تظهر خلال استعماله أعراض جانبية مثل: جفاف الفم، نعاس، دوار، عصبية، شعور بعدم الارتياح، غثيان، آلام البطن وإسهال.

الأعراض الجانبية لمستحضر بارافلو أقراص التي تقتضي اهتماماً خاصاً . يجب التوقف عن أكمال العلاج في حال ظهور أي منها وهي:

تفاعلات تحسسية ، انتفاخ الوجه، انتفاخ في الفم والحنجرة ، صعوبة في التنفس ، حكة وطفح جلدي في حال تناول أكثر من الجرعة الموصى بها، وقد يحصل إسهال، تقيؤ، ألم في المعدة، تشنج في البطن.

احتياطات:

إذا عانيت أو تعاني من الربو، القرحة، الجلوكوما، فرط إفراز الغدة الدرقية، خلل وظيفي في القلب و الأوعية الدموية، الكبد، الكلى، المسالك البولية، غدة البروستات، السكري أو الصرع: يرجى إعلام الطبيب الذي سوف يرشدك بدوره لإمكانية استخدام العلاج.

التحذيرات:

- يجب عدم تناول مستحضر بارافلو أقراص مع أدوية أخرى تحوي براسيتامول.
- المستحضر بارافلو أقراص يحتوي على براسيتامول. قد يحدث خلل حاد في الكبد في حالة:
 - تناولت أكثر من 8 أقراص خلال 24 ساعة .
 - تناولت بارافلو مع أدوية أخرى تحوي براسيتامول.
 - شرب الكحول خلال فترة العلاج.

التفاعلات بين الأدوية:

إذا كنت تتعاطى دواء آخر أو انتهيت مؤخرًا من تعاطي دواء آخر، فعليك إخبار طبيبك لتفادي الأخطار أو عدم النجاعة الناتجة عن التفاعلات بين الأدوية وبصورة خاصة الأدوية التي تنتمي الى المجموعات التالية:

- الأسبرين والساليسيلات
- الأدوية المهدئة و المنومة
- أدوية الباركينسون
- أدوية الصرع
- أدوية الآلام والسخونة
- مضادات السعال والرشح
- مضادات الربو
- العقاقير اللاستروبيدية المضادة للالتهابات
- مضادات الاكتئاب النفسي من فصيلة مثبطات مونو أمينو اوكسيداز
- المضادات الحيوية من نوع أمينوجليكوسايد

الحمل والإرضاع والاستخدام لدى الأطفال:

- استشيرى الطبيب إن كنت حاملا أو مرضع
- لا يعطى بارافلو للأطفال الخدج و حديثي الولادة.

تحذيرات:

- قد يؤثر بارافلو على يقظتك، لذلك لا يجب أخذه قبل قيادة المركبات أو تشغيل الآلات الخطرة

- لا تأخذ كميات كبيرة من الشاي أو القهوة خلال استخدام بارافلو.

لتجنب التسمم:

- احفظ الدواء بعيداً عن متناول أيدي الأطفال
- إذا تناولت جرعة زائدة أو إذا ابتلع طفل الدواء عن طريق الخطأ، عليك مراجعة قسم الطوارئ مع أخذ الكمية المتبقية من العلاج
- لا تحاول إحداث التقيؤ دون استشارة الطبيب
- لا تأخذ الدواء في الظلام و تأكد من اسم الدواء الموصوف لك
- تأكد دائماً من تاريخ نهاية صلاحية الدواء و لا تأخذ الدواء بعد تاريخ الانتهاء المذكور
- تجنب تعريض الدواء للحرارة و الرطوبة الشديتين
- تناول الدواء حسب الحاجة فقط ولا تتجاوز الجرعة الموصوفة.

الجرعة الدوائية:

الأقراص:

- الكبار والأطفال أكبر من 12 سنة: قرصان ، 3-4 مرات يوميا
- الجرعة القصوى المسموح بها من أقراص بارافلو هي 8 أقراص يوميا.

الشراب:

- الأطفال من عمر 6-12 سنة: ملعقة صغيرة ، 3-4 مرات يوميا
- الأطفال من عمر 2-6 سنوات: نصف ملعقة صغيرة، 3-4 مرات يوميا

طريقة الاستخدام:

يفضل تناول بارافلو مع الطعام.

التخزين:

- أقراص : يحفظ في مكان جاف ، على درجة حرارة ما بين 15-30 °م.
- شراب للأطفال : احفظ الدواء على درجة حرارة ما بين 15-30 °م .

العبوة:

- عبوة تحتوي على 20 قرص مغلف
- عبوة تحتوي على 60 مليلتر من الشراب.

شارع المدارس رقم 81

ص . ب 58

بيت جالا - فلسطين

<http://www.beitjalapharma.co>

1401120-4