

RISINE

Sterile Eye Drops

Composition:

Tetrahydrozoline HCl 0.05%

Therapeutic Activity:

Vasoconstrictor.

Indications:

Risine is indicated to relieve eye redness, congestion, itching and minor irritation resulting from exposure to wind, sun, dust, smoke, plant allergies, night driving, reading, watching television, swimming and contact lenses.

When should not this medicine be used:

Risine is contraindicated in patients with a known hypersensitivity to tetrahydrozoline. Risine is contraindicated in patients with angle-closure glaucoma or other serious eye diseases.

Risine is contraindicated in children younger than 2 years of age.

Side Effects:

In addition to the desired effects of Risine, some side effects may occur during the course of taking this medicine.

Prolonged use of Risine may cause blurred vision, irritation, mydriasis and rebound congestion, characterized by chronic redness and swelling.

Risine may occasionally cause systemic side effects such as headache, weakness and sweating.

Precautions:

- In children, excessive dosage of Risine may cause severe drowsiness accompanied by profuse sweating.
- Overuse of Risine may produce increased redness of the eye.
- Risine should be discontinued and the physician should be consulted if the patient experience eye pain, changes in vision, continued redness or irritation of the eye, or if the condition worsens or persists for more than 72 hours.

Pregnancy and Nursing:

- Risine should be used during pregnancy only when clearly needed.
- Risine should be used with caution in nursing women, since no information is available concerning the distribution of Tetrahydrozoline in breast milk.

To Avoid Poisoning:

- 1-Keep the medicine out of the reach of children

- 2-If a child swallowed the medication accidentally, seek help at an emergency and take the remaining medicine with you
- 3-Do not induce vomiting without consulting your physician
- 4-Do not apply your medication in the dark, always read the label and make sure you are using the right medication
- 5-Always notice the expiry date, and never use medicines after that date
- 6-Avoid exposure of the drug to excessive heat and humidity during storage
- 7-Use the drug only as needed and do not exceed the prescribed dose.

Cautions:

- Treatment generally should not be continued for longer than 3-4 days unless under the direction of the physician.
- Excessive dosage and/or prolonged or too frequent use of Risine should be avoided.

Dosage:

1-2 drops of Risine to be applied topically on the conjunctiva up to 4 times daily, or as directed by the physician.

Directions for Use:

- Risine is applied topically on the conjunctiva.
- Care must be taken to avoid contamination of the dropper.
- To minimize the risk of spreading infection, the dropper should not be used by more than one person.
- Recap the bottle after each use.
- Contact lenses should be removed before application.

Attention:

This medicine is intended for external use only.


Storage:

Store at a temperature between 15-30 ° C

Care should be taken not to use the medicine 14 days after opening the bottle.

Presentation:

A bottle of 10 ml sterile solution with a dropper.



81, Al-Madaress St.
P.O.Box 58
Beit Jala - Palestine
<http://www.beitjalapharma.com>

رايزين قطرة للعين

التركيبية الدوائية:

تيتراهايدروزولين هايدروكلورايد 0.5% .

الفاعلية العلاجية:

قابض للأوعية الدموية

الاستعمالات:

يستعمل رايزين للتخلص من احمرار العين ، الاحتقان، الحكة، و التهيج الناتج عن التعرض للرياح، الشمس، الغبار، الدخان، الحساسية لبعض النباتات، السياقة الليلية، القراءة، مشاهدة التلفاز، السباحة، والعدسات اللاصقة.

متى يمنع استعمال هذا الدواء:

لا يستعمل رايزين للمرضى الذين لديهم حساسية لتيتراهايدروزولين
لا يستعمل رايزين في حالة الجلوكوما أو أمراض العين الأخرى
لا يستعمل رايزين للأطفال دون عمر سنتين

الأعراض الجانبية:

إضافة إلى التأثيرات المرغوبة لرايزين، قد تحدث بعض الأعراض الجانبية خلال فترة استخدام هذا العلاج.
استخدام رايزين لفترات طويلة قد يحدث تشوش في الرؤية، تهيج، اتساع البؤبؤ، واحتقان ارتدادي يتميز باحمرار مزمن وانتفاخ.
استخدام رايزين قد يحدث أحيانا تأثيرات جسمية مثل الصداع، التعب، والتعرق.

احتياطات:

- قد تحدث الجرعات الزائدة الكبيرة من رايزين للأطفال ناعاسا خطرا مصحوبا بتعرق.
- الإفراط في استخدام رايزين قد يؤدي إلى زيادة احمرار العين.
- يجب التوقف عن استخدام رايزين واستشارة الطبيب اذا حصل للمريض ألم في العين، تغير في الرؤية، استمرار الاحمرار أو التهيج، أو اذا تفاقت الحالة أو استمرت لأكثر من 72 ساعة.

الحمل و الإرضاع:

- يجب استعمال رايزين خلال فترة الحمل فقط في حالة الضرورة
- استخدام رايزين يجب أن يكون بحذر للنساء المرضعات حيث أنه لا تتوفر معلومات عما اذا كان تيتراهايدروزولين ينتشر في حليب الأم المرضع.

لتجنب التسمم:

- 1- احفظ الدواء بعيدا عن متناول أيدي الأطفال
- 2- إذا ابتلع طفل الدواء عن طريق الخطأ، فيجب عليك مراجعة قسم الطوارئ مع أخذ الكمية المتبقية من العلاج.
- 3- لا تحاول إحداث التقيؤ دون استشارة الطبيب
- 4- لا تستخدم الدواء في الظلام وأقرأ التعليمات وتأكد من اسم الدواء عند كل استعمال
- 5- تأكد دائما من تاريخ نهاية صلاحية الدواء ولا تستخدم الدواء بعد تاريخ الانتهاء المذكور
- 6- تجنب تعريض الدواء للحرارة والرطوبة الشديديتين خلال فترة التخزين.
- 7- استعمال الدواء حسب الحاجة فقط ولا تتجاوز الجرعة الموصوفة.

تحذيرات:

- يجب أن لا يستمر العلاج عادة لفترة تزيد عن 3-4 أيام ما لم يكن تحت إشراف الطبيب.
- يجب تجنب الجرعة الزائدة و/أو الاستخدام لفترات طويلة أو التكرار الكثير لرايزين.

الجرعة الدوائية:

توضع نقطة إلى نقطتين من رايزين موضعيا على ملتحمة العين لغاية 4 مرات يوميا، أو حسب ارشادات الطبيب.

تعليمات الاستخدام:

- يوضع رايزين موضعيا على ملتحمة العين
- يجب توخي الحذر لتجنب تلوث القطارة
- للتقليل من خطورة انتشار الإصابة، يجب عدم استخدام القطارة من قبل أكثر من شخص واحد
- أعد الغطاء الى العبوة بعد كل استخدام
- يجب إزالة العدسات اللاصقة قبل كل استخدام

تنبيه:

هذا الدواء معد للاستخدام الخارجي فقط.

التخزين:

احفظ الدواء على درجة حرارة ما بين 15-30 °م
يجب الانتباه لعدم استخدام الدواء بعد 14 يوما من تاريخ فتح العبوة.

العبوة:

عبوة تحتوي على 10 مليلتر سائل معقم مع قفّارة.



شركة بيت جالا لصناعة الأدوية

شارع المدارس رقم 81

ص . ب 58

بيت جالا - فلسطين

<http://www.beitjalapharma.com>