

# ZYDEX CREAM

## **Prescription Only Medicine**

### **Composition:**

Fusidic Acid                    2% w/w  
Preservative: Methyl paraben.

### **Therapeutic Activity:**

Topical antibacterial.

### **Indications:**

Zydex cream is indicated for the treatment of skin infections (such as impetigo, infected wounds and infected burns) caused by bacteria sensitive to the active ingredient.

### **When should not the product be used:**

- Zydex is contraindicated in patients with known hypersensitivity to fusidic acid or any other ingredient of the drug.
- Zydex is contraindicated in bacterial infections due to non-susceptible organisms, fungal infections, tuberculosis of the skin, syphilitic skin infections, chicken pox, eruption following vaccinations and viral diseases of the skin in general.

### **Side Effects:**

In addition to the desired effects of Zydex, some side effects may occur during the course of treatment such as: mild local irritation, pain (when applied to deep leg ulcers), swelling and rash.

### **Precautions:**

Zydex cream should not be used in or near the eye because of the possibility of conjunctival irritation.

### **Drug Interactions:**

If you are taking another drug concomitantly or if you have just finished treatment with another drug inform your physician, in order to prevent hazards or lack of efficacy resulting from drug interactions.

### **Do not use this medicine without consulting a physician before starting treatment:**

If you are pregnant, breast-feeding or planning to become pregnant.

### **To Avoid Poisoning:**

1. Keep the medicine out of the reach of children.
2. If a child swallowed the medication accidentally, seek help at an emergency and take the remaining medicine with you.
3. Do not induce vomiting without consulting the physician
4. Do not apply your medication in the dark, always read the label and make sure you are using the right medication.
5. Always notice the expiry date and never use the medicine after the mentioned date.

6. Avoid exposure of the drug to excessive heat and humidity during storage.
7. Use the drug only as prescribed. In case any adverse effect develops, discontinue use and consult your physician.

**Recommended dosage unless otherwise prescribed by your physician:**

Zydex cream should be applied topically 3-4 times daily into the affected area.

**Missed Dose:**

Apply Zydex cream as soon as you remember but never use if it is almost time for the next application.

**Directions for Use:**

- Apply sparingly a thin film and rub gently into the affected area.
- Do not cover the affected area, unless directed by the physician.
- Do not interrupt the period of treatment prescribed to you by yourself.

**Attention:**

For external use only.

**Storage:**

Store at a temperature between 15 – 30°C, protect from freezing.

**Presentation:**

A tube of 15 g cream.



Beit Jala Pharmaceutical Co.

81, Al-Madaress St.

P.O.Box 58

Beit Jala - Palestine

<http://www.beitjalapharma.com>

# زايدكس

كريم

هذا الدواء ملزم بوصفة طبية

## التركيبية الدوائية:

حامض الفيوسيد 2% وزن / وزن  
المادة الحافظة ميثيل بارابين.

## الفاعلية العلاجية:

مضاد بكتيري موضعي.

## الاستعمالات:

يستخدم زايدكس كريم لعلاج الإصابات الجلدية مثل: الحصف والجروح والحروق المصابة التي تسببها البكتيريا الحساسة للمادة الفعالة.

## متى يمنع استخدام هذا الدواء:

- يمنع استخدام زايدكس للمرضى الذين يشكون من حساسية معروفة لحامض الفيوسيد او لاي مكونات أخرى للدواء.
- كما يمنع استخدامه في العدوى البكتيرية التي تسببها كائنات غير حساسة للدواء, العدوى الفطرية, التدرن الجلدي, السفلس الجلدي, الجدري, الطفح الناتج عن التطعيم, وكذلك امراض الجلد الفيروسية بشكل عام.

## الأعراض الجانبية:

إضافة الى التأثيرات الطبية المرغوبة للدواء قد تحدث بعض الأعراض الجانبية خلال فترة العلاج مثل: تهيج موضعي خفيف، ألم (عندما يوضع على التقرحات العميقة في الأرجل)، انتفاخ وطفح جلدي.

## احتياطات:

يجب ان لا يوضع زايدكس كريم في العين أو بالقرب منها لأنه قد يسبب تهيج الملتحمة.

## التفاعلات الدوائية:

اذا كنت تتعاطى دواءً آخرًا أو إذا انتهيت حديثاً من استخدام دواء آخر، اعلم طبيبك بذلك لمنع أي اخطار او عدم النجاعة الناتجة عن التفاعلات الدوائية.

## لا تستخدم هذا الدواء دون استشارة الطبيب قبل بدء العلاج:

إذا كنت حاملاً، مرضعاً، أو تخططين للحمل.

### لتجنب التسمم:

1. تخزن الأدوية بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.
2. إن تناول طفل الدواء عن طريق الخطأ ، يجب التوجه مباشرة الى قسم الطوارئ مع اخذ الكمية المتبقية من الدواء.
3. لا تحاول احداث التقيؤ دون استشارة الطبيب.
4. لا تستخدم دواءك في الظلام وقرأ التعليمات لتتأكد انك تستخدم الدواء الموصوف لك.
5. تأكد دائماً من تاريخ نهاية صلاحية الدواء ولا تستخدم الدواء بعد تاريخ الانتهاء المذكور.
6. تجنب تعريض الدواء للحرارة والرطوبة الشديديتين خلال فترة التخزين.
7. استخدم الدواء حسب الوصفة فقط، في حال ظهور أي أعراض جانبية، توقف عن استخدام العلاج واعلم طبيبك.

### الجرعة الدوائية الموصى بها ما لم توجد تعليمات اخرى من قبل الطبيب:

يستخدم زايدكس كريم موضعياً 3 – 4 مرات يومياً على المنطقة المصابة.

### في حال نسيان الجرعة:

استخدم زايدكس كريم حال تذكرك ذلك ما لم يكن موعد الجرعة الثانية.

### تعليمات الاستخدام:

- ضع طبقة رقيقة وافركها برفق على المنطقة المصابة.
- لا تقم بتغطية المنطقة المصابة إلا إذا أشار الطبيب إلى ذلك.
- لا توقف فترة العلاج الموصوفة لك من تلقاء نفسك.

### تنبيه:

للاستعمال الخارجي فقط.

### التخزين:

احفظ الدواء على درجة حرارة ما بين 15-30°م، بعيداً عن التجميد.

العروة:

أنبوب يحتوي على 15 غم كريم.



شركة بيت جالا لصناعة الأدوية

شارع المدارس رقم 81

ص . ب 58

بيت جالا- فلسطين

<http://www.beitjalapharma.com>

1409100-1