

# HEALER Cream

## **Prescription Only Medicine**

### **Composition:**

Mafenide Acetate equivalent to Mafenide 8.5% w/w

### **Therapeutic Activity:**

An anti-infective agent for topical treatment of burn wound infections

### **Indications:**

Healer cream is used as an adjunct in the treatment of second and third-degree burns

### **When should not this preparation be used:**

Healer cream is contraindicated in patients with known hypersensitivity to Mafenide acetate.

### **Precautions:**

- Use of this medication for prolonged or repeated periods may result in a secondary infection of the skin.
- If your condition doesn't improve within few days or become worse, check with your physician.

### **Side Effects:**

In addition to the desired effects of Healer cream, some side effects may occur during the course of treatment such as:

Pain or burning sensation, changes in skin appearance and redness.

If rash, swelling or blisters appear while using the drug, discontinue use and refer to your physician.

### **Drug Interactions:**

If you are taking another medicine concomitantly or if you have just finished treatment with another medicine inform your physician in order to prevent hazards or lack of efficacy resulting from drug interactions.

### **Do not take this medicine without consulting your physician before starting treatment:**

- If you have any allergies, lung disease/breathing trouble, kidney diseases, and metabolism problems (G6PD deficiency & blood problems) .
- If you are pregnant, and during breast-feeding.
- In infants up to 2 months of age.

### **To Avoid Poisoning:**

1. Keep the medicine out of the reach of children.
2. If an excessive dose is applied, or if a child swallowed the medication accidentally, seek help at an emergency and take the remaining medicine with you.
3. Do not induce vomiting without consulting the physician.
4. Do not apply your medication in the dark, always read the label and make sure you are using the right medication.
5. Always notice the expiry date and never use the medicine after that date.
6. Avoid exposure of the drug to excessive heat and humidity during storage.

7. Use the drug only as prescribed. In the case any adverse effects not mentioned in the leaflet develops, discontinue use and consult your physician.

**Dosage and Directions for Use:**

- The affected area should be cleansed and debrided, then apply a thin film of the cream with a sterile gloved hand once to twice daily, as directed.
- Burned skin should be covered with this medication at all times, and should be reapplied to any area from which it has been removed.
- Duration of treatment depends on your medical condition and response to therapy.
- Do not stop using this medication until told to do so by your physician.
- Do not cover the affected area unless directed by your physician.

**Missed Dose:**

- Apply the missed dose as soon as you remember, unless it is the time for your next dose, skip the missed one and continue as your regular dose schedule.
- Do not double the dose.

**Attention:**

For external use only.

**Storage:**

Store at a temperature between 15 -30°C.

**Presentation:**

A tube of 15 g cream.



**Beit Jala Pharmaceutical Co.**

81, Al-Madaress St.

P.O.Box 58

Beit Jala -Palestine

<http://www.beitjalapharma.com>

1409055-0

# هيلر كريم

ملزم بوصفة طبية

## التركيبة الدوائية:

مافينيد اسيتات ما يعادل مافينيد 8.5% وزن/وزن

## الفاعلية العلاجية:

مضاد موضعي لمعالجة الإصابات الجرثومية على جروح الحروق .

## الاستعمالات:

يستعمل هيلر كريم كعامل مساعد في علاج الحروق من الدرجة الثانية والثالثة.

## متى يمنع استعمال هذا العلاج:

يمنع استخدام كريم هيلر للمرضى الذين لديهم حساسية معروفة للمافينيد اسيتات.

## الاحتياطات:

- إن استعمال الدواء لفترات طويلة أو متكررة قد يحدث التهاب ثانوي في الجلد.  
- إذا لم يطرأ تحسن على حالتك خلال أيام أو إذا زادت سوء أعلم طبيبك بذلك.

## الأعراض الجانبية:

إضافة إلى التأثيرات العلاجية المرغوبة لهيلر كريم، قد تحدث بعض الاعراض الجانبية خلال فترة العلاج مثل:  
ألم أو شعور بالحرق، تغييرات في شكل الجلد و احمرار.  
إذا ظهرت أعراض طفح، انتفاخ او نفطة أثناء استعمال الدواء، توقف عن استعمال الدواء واعلم طبيبك بذلك.

## التفاعلات بين الادوية:

إذا كنت تستخدم دواءً آخر في نفس الوقت او انتهيت مؤخراً من العلاج بدواء اخر اعلم طبيبك بذلك لتجنب المخاطر او قلة نجاعة العلاج التي تنتج من التفاعلات بين الأدوية

## لا تستخدم هذا الدواء دون استشارة طبيبك قبل بدء العلاج:

- إذا كنت تعاني من أي حساسية، مرض في الرئة/ مشكلة في التنفس، أمراض في الكلى، مشاكل في عمليات الأيض (نقص G6PD ومشاكل في الدم).
- إذا كنت حاملاً و خلال فترة الرضاعة.
- لدى الأطفال دون الشهرين من العمر.

## لتجنب التسمم:

1. احفظ الدواء بعيداً عن متناول ايدي الاطفال .
2. اذا استخدمت جرعة زائدة او اذا تناول طفل الدواء عن طريق الخطأ يجب التوجه مباشرة الى قسم الطوارئ مع اخذ الكمية المتبقية من الدواء.
3. لا تحاول احداث التقيؤ دون استشارة الطبيب.
4. لا تستخدم دواءك في الظلام و اقرأ التعليمات لتتأكد انك تستخدم الدواء المناسب.
5. تأكد دائماً من تاريخ نهاية صلاحية الدواء ولا تستخدم الدواء بعد هذا التاريخ.
6. تجنب تعريض الدواء للحرارة والرطوبة الشديتين خلال فترة التخزين.

7. استخدم الدواء حسب الوصفة فقط. في حالة ظهور أي اعراض جانبية غير واردة في النشرة، توقف عن استخدام العلاج و اعلم طبيبك.

#### **الجرعة وتعليمات الاستخدام:**

- يجب تنظيف المنطقة المصابة و تقشيرها، بعد ذلك ضع طبقة رقيقة من الكريم، بعد وضع الففازات المعقمة مرة إلى مرتين يومياً حسب الوصفة.
- يجب تغطية الجلد المحروق بهذا المستحضر- كل الأوقات، و يجب وضع الكريم مرة أخرى على اي منطقة يزال عنها الكريم.
- مدة العلاج تعتمد على وضعك الصحي و الإستجابة للعلاج.
- لا توقف استعمال الدواء إلا إذا اشار طبيبك بذلك.
- لا تغطي المنطقة المصابة إلا إذا اشار طبيبك بذلك

#### **في حال نسيان الجرعة:**

- استخدم الجرعة المنسية حالما تتذكر و لكن اذا اقترب موعد الجرعة التالية فاترك الجرعة المنسية و اكمل حسب جدول الجرعات الاعتيادي.
- لا تقم بمضاعفة الجرعة.

#### **تنبيه:**

للاستعمال الخارجي فقط.

#### **التخزين:**

احفظ الدواء على درجة حرارة ما بين 15- 30°م.

#### **العبوة:**

انبوب يحتوي على 15 غرام كريم.



شركة بيت جالا لصناعة الأدوية

شارع المدارس رقم 81

ص . ب 58

بيت جالا- فلسطين

<http://www.beitjalapharma.com>