

HiTri 10

Tablets

Prescription Only Medicine

Composition:

HiTri 10 tablets:

Each tablet contains:

Ezetimibe 10 mg

Therapeutic Activity:

Lipid Absorption Inhibitor.

Indications:

- HiTri tablets are indicated as an adjunct to the diet to reduce blood cholesterol
- HiTri is sometimes given together with medicines of the statin family (such as; simvastatin and atorvastatin).

When Should Not This Preparation Be Used:

HiTri tablets are contraindicated in the following conditions:

- Patients with known hypersensitivity to Ezetimibe
- Patients with active liver disease who are on statins
- Lactating mothers who are on statins
- Children less than 10 years.

Do Not Take This Medicine Without Consulting Your Physician Before

Starting Treatment:

- If you suffer and have suffered in the past from liver impairment
- If you have sensitivity to lactose
- If you are pregnant or planning to become pregnant.

Side Effects:

In addition to the desired effects of HiTri tablets, some side effects may appear during the course of treatment such as: Headache, diarrhea and abdominal pain.

(Allergic reactions have been reported in general use (which requires treatment right away) including (swelling of the face, lips, tongue, and/or throat that may cause difficulty in breathing or swallowing and rash).

When HiTri is used together with statins, some side effects may appear during the course of treatment such as: Headache, fatigue, abdominal pain, constipation,

diarrhea, flatulence, nausea, muscle aches, and elevations in some laboratory blood tests of liver function.

How Will This Medicine Affect Your Daily Life:

Hitri may cause dizziness. Do not drive or use any tools or machines requiring alertness. These effects may be worsening while taking this medicine with alcoholic beverages or certain medicines.

Warnings And Precautions:

- Tell your doctor about all your medical conditions including allergies.
- Your doctor should do a blood test before you start taking Hitri with a statin. This is to check how well your liver is working
- Your doctor may also want you to have blood tests to check how well your liver is working after you start taking Hitri with a statin
- If you have moderate or severe liver problems, Hitri is not recommended
- The safety and efficacy of the combined use of Hitri and the fibrates (cholesterol lowering medicines) have not been established

Drug Interactions:

If you are taking other medications concurrently or have just completed treatment with another drug inform your physician in order to prevent hazards or loss of efficacy arising from drug interactions, this is especially important when using drugs belonging to the following groups: Bile acid sequestrants (cholestyramine), cyclosporine, fibrates, and anticoagulants (such as; warfarin, phenprocoumon, or flindione).

To Avoid Poisoning:

1. Keep the medicine out of the reach of children
2. If an excessive dose is taken or if a child swallowed the medication accidentally, seek help at an emergency and take the remaining medicine with you
3. Do not induce vomiting without consulting the physician
4. Do not take your medication in the dark, always read the label and make sure you are taking the right medication
5. Always notice the expiry date and never use the medicine after the mentioned date
6. Avoid exposure of the drug to excessive heat and humidity during storage
7. Use the drug only as prescribed. In the case any adverse effect not mentioned in this leaflet develops, discontinue use and consult your physician.

Dosage And Directions For Use:

- The dose is according to physician's instructions

- Hitri tablets can be taken with or without food
- Take Hitri at least 2 hours before or 4 hours after taking the bile acid sequestrant (such as cholestyramine)
- Hitri can be taken at the same time with the statins
- Swallow Hitri tablets with a small amount of water. Do not chew or crush the tablet
- Maintain low cholesterol diet while undergoing treatment with Hitri
- Do not stop taking this medication without consulting your physician first.

Missed dose:

- Take the missed dose as soon as you remember, unless it is almost the time for your next dose, skip the missed one and continue as your regular dose schedule
- Do not double the dose to make up the missed dose.

Storage:

Store this medicine in its original pack at temperature between 15-30°C.

Presentation:

A box of 30 tablets.



Beit Jala Pharmaceutical Co.

81, Al-Madaress St.

P.O.Box 58

Beit Jala -Palestine

[http://www.beitjalapharma .com](http://www.beitjalapharma.com)

1401300-0

هاي تراي ١٠ أقراص

ملزم بوصفة طبية

التركيبة الدوائية:

أقراص هاي تراي ١٠ :
يحتوي القرص الواحد على :
إيزيتيميب ١٠ ملغم

الفاعلية العلاجية:

مانع إمتصاص الدهون.

الإستعمالات:

تستخدم أقراص هاي تراي كمساعد لنظام الحماية لخفض نسبة الكوليسترول في الدم-

- يعطى هاي تراي في بعض الأحيان كعلاج مشترك مع أدوية من فصيلة الستاتينات (مثل سيمفاستاتين وأتورفاستاتين).

متى يمنع إستعمال هذا العلاج:

- يمنع إستخدام أقراص هاي تراي في الحالات التالية:
- المرضى الذين لديهم حساسية معروفة للإيزيتيميب
- المرضى الذين يعانون من مرض نشط في الكبد و يستخدمون الستاتينات
- المرضعات اللواتي يستخدمن الستاتينات
- الأطفال دون العاشرة من العمر.

لا تستخدم هذا الدواء دون استشارة طبيبك قبل بدء العلاج:

- إذا كنت تعاني أو عانيت في الماضي من خلل في وظيفة الكبد
- إذا وجد لديك حساسية للاكتوز
- إذا كنت حاملاً أو تخططين لأن تصبحي حاملاً.

الأعراض الجانبية:

إضافة إلى التأثيرات العلاجية المرغوبة لدواء هاي تراي ، قد تحدث بعض الأعراض الجانبية خلال فترة العلاج مثل: صداع، إسهال وألم في البطن.
(يمكن حدوث تفاعلات الحساسية خلال الإستعمال بشكل العام) ذلك يتطلب علاج فوري) بما في ذلك (إنتفاخ في الوجه، الشفتين، اللسان، و /أو الحلق التي قد تسبب صعوبة في التنفس أو البلع وطفح جلدي).

عند الإستعمال المشترك لهاي تراي مع الستاتينات ، قد تحدث بعض الأعراض الجانبية خلال فترة العلاج مثل:صداع، إرهاق، ألم في البطن، إمساك، إسهال، غازات في البطن، غثيان، آلام في العضلات و إرتفاع في بعض فحوصات الدم المخبرية لوظيفة الكبد.

كيف يؤثر هذا الدواء على حياتك اليومية:

قد يسبب هاي تراي الدوار. لا تقم بالسياسة أو إستعمال أدوات أو آلات تتطلب اليقظة. هذه الأعراض قد تصبح أكثر سوءاً أثناء تناول هذا الدواء مع المشروبات الكحولية أو أدوية معينة.

التحذيرات و الإحتياطات:

- أبلغ طبيبك عن كل حالاتك الطبية بما في ذلك حالات الحساسية

- سيقوم طبيبك بتوجيهك إجراء فحص دم قبل أن تبدأ بتناول هاي تراي مع ستاتين. وذلك لكي

يفحص إلى أي حد يعمل الكبد الخاص بك بشكل جيد

- من الممكن أن يرغب طبيبك بتوجيهك إجراء فحص دم لكي يفحص إلى أي حد يعمل الكبد

الخاص بك بشكل جيد بعد أن بدأت بتناول هاي تراي مع ستاتين

- إذا كنت تعاني من مشاكل متوسطة أو حادة في الكبد، هاي تراي غير موصى به

- الأمان والفاعلية للعلاج المشترك بهاي تراي والفيبرات (أدوية لخفض الكوليسترول) غير مؤكدة.

التفاعلات بين الأدوية:

إذا كنت تستخدم دواءً آخرًا في نفس الوقت أو إنتهيت مؤخراً من العلاج بدواء آخر، اعلم طبيبك بذلك لتجنب المخاطر أو قلة نجاعة العلاج التي تنتج من التفاعلات بين الأدوية ' هذا مهم خاصة عندما تستخدم أدوية تنتمي للمجموعات التالية: الأدوية الرابطة للحموض الصفراوية (الكوليستيرامين) سيكلوسبورين ' فايبرات ومميعات الدم (مثل الوارفارين، فينبروكومون أو الفلوينديون).

لتجنب التسمم:

١. احفظ الدواء بعيداً عن متناول أيدي الأطفال

٢. إذا تناولت جرعة زائدة أو إذا تناول طفل الدواء عن طريق الخطأ، عليك التوجه مباشرة الى قسم الطوارئ مع اخذ الكمية المتبقية من الدواء

٣. لا تحاول إحداث التقيؤ دون إستشارة الطبيب

٤. لا تتناول دواؤك في الظلام واقرأ التعليمات لتتأكد أنك تأخذ الدواء الموصوف لك

٥. تأكد دائماً من تاريخ نهاية صلاحية الدواء ولا تأخذ الدواء بعد تاريخ الإنتهاء المذكور

٦. تجنب تعريض الدواء للحرارة والرطوبة الشديديتين خلال فترة التخزين
٧. تناول الدواء حسب الوصفة فقط. في حالة ظهور أي أعراض جانبية غير واردة في
النشرة، توقف عن إستخدام العلاج واعلم طبيبك.

الجرعة الدوائية و تعليمات الإستخدام:

- الجرعة حسب إرشادات الطبيب.
- يمكن تناول أقراص هاي تراي مع أو بدون الطعام
- تناول هاي تراي ساعتين على الأقل قبل أو ٤ ساعات بعد تناول الدواء الرابط
للحموض الصفراوية (مثل الكوليستيرامين)
- يمكن تناول هاي تراي مع الستاتين في أن واحد
- ابتلع أقراص هاي تراي مع القليل من الماء. لا تقم بمضغ أو كسر القرص
- حافظ على تناول غذاء غيرغني بالكوليسترول أثناء إستخدام هاي تراي
- لا تتوقف عن تناول هذا الدواء دون إستشارة طبيبك أولاً.

في حال نسيان الجرعة:

- تناول الجرعة المنسية حالما تتذكر ' ولكن إذا اقترب موعد الجرعة التالية، اترك
الجرعة المنسية واكمل حسب جدول الجرعات الإعتيادي
- لا تقم بمضاعفة الجرعة لتعويض الجرعة المنسية.

التخزين:

احفظ هذا الدواء في عبوته الأصلية على درجة حرارة ما بين ١٥ - ٣٠° م .

العبوة:

علبة تحتوي على ٣٠ قرص.



شارع المدارس رقم ٨١

شركة بيت جالا لصناعة الأدوية

ص . ب ٨٥

بيت جالا- فلسطين

<http://www.beitjalapharma.com>

