

INDOGEL

Emulgel

Composition:

Indogel emulgel contains:
Indomethacine 1 % w/w.

Therapeutic Activity:

Non-steroidal anti-inflammatory and analgesic.

Indications:

Indogel is indicated for the relief of muscular pain, backache, sciatica, lumbago and rheumatic pain.

When should the product not be used:

- Indogel should not be used in cases of known hypersensitivity to indomethacine, acetylsalicylic acid, or to any ingredient in the product.
- Indogel is contraindicated for asthmatic patients, and in cases of renal function impairment.

Side Effects:

In addition to the desired effects of the drug, some side effects may occur during the course of treatment, such as:
Dryness, burning, rash, redness, pruritus, and itching of the skin.

Precautions:

- Indogel should not be applied on open wounds, infected skin, mucous membranes, or eyes.
- Indogel should not be used for children less than 14 years of age.

Drug Interactions:

There have been no reports of any interaction of indomethacine topical application with other drug categories.

Do not take this medicine without consulting a doctor before starting treatment:

If you are pregnant or breast feeding

Caution:

- Occlusive dressing should not be applied at the site of treatment.
- Indogel is intended for external use only.

To Avoid Poisoning:

- Keep the medicine out of the reach of children.
- If a child swallowed the medication accidentally seek help at an emergency and take the remaining medicine with you.
- Do not induce vomiting without consulting your physician.
- Do not use your medication in the dark, always read the label and make sure you are taking the right medication.
- Always notice the expiry date, and never use medicines after that date.
- Avoid exposure of the drug to excessive heat and humidity during storage.
- Take the drug only as needed and do not exceed the prescribed dose.

Dosage & Direction For Use:

Indogel is applied 3-4 times daily on the affected area, rubbed in lightly and allowed to penetrate.

Storage:

Store at room temperature between 15-30 ° C.
Protect from freezing.

Presentation:

A tube of 45 Gm. emulgel.



Beit Jala Pharmaceutical Co.

81, Al-Madaress Str.

P.O.Box 58

Beit Jala/Palestine

<http://www.jclaboratory.com>

اندوجل املجل

التركيبة الدوائية:

اندوجل املجل يحتوي على:
اندوميثاسين 1%

الفاعلية العلاجية:

مضاد للالتهاب لاستيرويدي و مسكّن للألم.

الاستعمالات:

يستعمل اندوجل للتخلص من آلام العضلات، آلام الظهر، ألم العصب الوركى، ألم قطني (Lumbago)، و آلام الروماتيزم.

متى يمنع استخدام الدواء:

- يجب عدم استعمال اندوجل في حالة وجود حساسية لاندوميثاسين، اسيتيل ساليسيليك اسيد، أو لأي من مكونات المستحضر.
- يجب عدم استعمال اندوجل لمرضى الأزمات، و في حالة الفشل الكلوي.

الأعراض الجانبية:

إضافة إلى الفعالية المرغوبة للدواء، قد تظهر بعض الأعراض الجانبية خلال فترة استعماله مثل:
جفاف، حرقة، طفح، احمرار، هرش، و حكة في الجلد.

احتياطات:

- يجب عدم استعمال اندوجل على الجروح المفتوحة، الجلد الملتهب، الأغشية المخاطية، أو العينين.
- يجب عدم استعمال اندوجل للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 سنة.

التفاعلات بين الأدوية:

لا تتوفر تقارير عن تفاعل مادة الاندوميثاسين المستخدمة موضعياً مع فئات دوائية أخرى.

لا تستخدم هذا الدواء دون استشارة الطبيب قبل بدء العلاج:

عندما تكونين حاملاً أو مرضعة

تحذير:

- يجب عدم وضع الضمادات على المنطقة المعالجة.
- اندوجل للاستعمال الخارجي فقط.

لتجنب التسمم:

- احفظ الدواء بعيداً عن متناول الأطفال
- إذا ابتلع طفل الدواء عن طريق الخطأ عليك مراجعة قسم الطوارئ مع أخذ الكمية المتبقية من العلاج.
- لا تحاول إحداث التقيؤ دون استشارة الطبيب
- لا تستعمل الدواء في الظلام و تأكد من اسم الدواء عند كل استعمال
- تأكد دائماً من تاريخ نهاية صلاحية الدواء و لا تأخذ الدواء بعد ذلك التاريخ
- تجنب تعريض الدواء للحرارة و الرطوبة الشديتين خلال فترة التخزين.
- استعمل الدواء حسب الحاجة فقط و لا تتجاوز الجرعة الموصوفة.

الجرعة و طريقة الاستخدام:


يستخدم اندوجل 3-4 مرات يوميا على المنطقة الملتهبة، و يدلّك بلطف و يترك ليتم امتصاصه.

التخزين:

يحفظ على درجة حرارة الغرفة بين 15-30 ° م.
يمنع تجميد الدواء.

العبوة:

انبوب يحتوي على 45 غرام املجل.

 شركة بيت حالا لصناعة ال
شارع المدارس رقم 81
ص.ب 58
بيت حالا - فلسطين
<http://www.jclaboratory.com>